

Gynura Procumbens

Tento tropický polokeř se pěstuje především pro své neobvyklé listy, které jsou ozubené a mají sytě zelenou barvu a jsou porostlé purpurovým chmýřím. Právě purpurové ochmýření rostlině dodává zvláštní půvab. Na jaře rostlina kvete oranžovými pampeliškovitými květy. Tyto květy rostlinu spíše hyzdí, protože po otevření silně zapáchají. Květy se proto doporučují zaštipovat, jakmile se objeví. Stavbou svých listů je rostlina podobná kopřivě.

Odrůdy: Gynura sarmentosa má nachově zbarvené listy, Gynura aurantiaca má listy větší a již není tak pohledná

Původ: roste v teplých a vlhkých lesích ostrova Jáva

Druh: převislá pokojová rostlina

Typ listu: střední listy, zubovité

Barva listu: tmavě zelené, různobarevné

Barva květu: oranžová

Kvete: Kvete od jara do léta.

Výška: 20 - 45 cm

Vůně: Květy zapáchají.

Náročnost pěstování: Je to nenáročná rostlina na pěstování.

Použití: Rostlina obzvláště vynikne v závěsné nádobě.

Tvarování / řez: Rostlinu pravidelně zaštipujeme, aby se bohatě rozrostla.

Trvanlivost: Je to víceletá rostlina, ale mladé rostliny jsou vzhlednějši než staré.

Nároky na světlo: přímé světlo, polostín

Odolnost: nemrazuvzdorná

Vlhkomilnost: normální

Substrát: rašelina

Doba květů: březen, duben, květen, červen, červenec, srpen

Požadavky na pěstování

Světlo: Rostlina vyžaduje jasné světlo, aby měla výrazné zbarvení. Na méně slunném místě listy zezelenají a rostlina nekvete. Nevadí jí přímé slunce.

Teplota: Rostlina není náročná na teplotu, vyhovuje jí běžná pokojová teplota. V zimě by však neměla klesnout pod 10° C.

Voda: V době vegetace vydatně zaléváme, v zimě zálivku omezíme.

Vlhkost: Jelikož se jedná o rostlinu tropickou, svědčí jí zvýšená vlhkost vzduchu. Rostlinu postavíme do misky s vlhkými kamínky. Listy nerosíme. Voda na listech způsobuje černé skvrny.

Hnojení: V době vegetace hnojíme 2x měsíčně standardním tekutým hnojivem.

Množení: Množíme na jaře vrcholovými řízků, které zakořeňují při teplotě půdy 18 - 21° C.

Před zasazením do zeminy řízek ponoříme do růstového hormonu.

Přesazování: Rostlina se obvykle nepřesazuje a vyplatí se spíše vypěstovat z řízků novou rostlinu. Jinak se přesazuje každý druhý rok.

Zemina: jednotná zemina nebo rašelinový substrát

Letnění: Vhodné je letnění na slunném stanovišti.

Čištění: Lesk na listy nesnáší.

Škůdci: Rostlina je napadána mšicemi, pokud je umístěna na tmavém místě.